

- Telefono: **0825 445522**
- Sito web: **www.centrocedir.it**
- Email: **esamicontrasto@centrocedir.it**

Preparazione Tomografia Computerizzata (TC) con e senza MDC

Gentile Paziente,

per effettuare l'esame di Tomografia Computerizzata (TC / TAC) con eventuale somministrazione di Mezzo di Contrasto (MDC) iodato in totale sicurezza, Le chiediamo di prendere visione delle seguenti indicazioni operative.

Si richiede di inviare i referti degli esami di laboratorio almeno **1 mese prima dell'esecuzione dell'indagine** tramite:

- Email: **esamicontrasto@centrocedir.it**
- WhatsApp: **0825 445522**



IN VIA WHAATSAPP

Le ricordiamo che per l'esecuzione dell'esame è necessario:

- Aver eseguito i seguenti **esami ematochimici obbligatori** (valida funzionalità renale):
 - Azotemia e Glicemia
 - Creatininemia con filtrato glomerulare (eGFR)
 - Quadro proteico elettroforetico
- **Solo per CARDIO TC:** oltre agli esami ematochimici, è obbligatorio portare in visione il referto di una **visita cardiologica** recente e l'**elettrocardiogramma (ECG)**;
- **Pazienti allergici (Protocollo SIAARTI):** in caso di allergie note, assumere per i 3 giorni precedenti l'esame la seguente terapia preventiva:
 - **Zirtec compresse:** 1 compressa la sera
 - **Bentelan 1 mg:** 1 compressa al mattino e 1 la sera dopo i pasti
 - **Nexium 20 mg:** 1 compressa al mattino e 1 la sera
- Presentarsi il giorno dell'esame digiuno da almeno **8 ore**;
- Il paziente deve venire sempre **accompagnato**;
- Presentare al momento dell'accettazione la **prescrizione specialistica** e tutta la documentazione radiologica o clinica precedente.

- Telefono: **0825 445522**
- Sito web: **www.centrocedir.it**
- Email: **esamicontrasto@centrocedir.it**

Informativa e Controindicazioni Tomografia Computerizzata

Sintesi informativa relativa all'esame TC

La Tomografia Computerizzata (TC o TAC) è una tecnica diagnostica che utilizza **radiazioni ionizzanti (Raggi X)** ed elaborazioni digitali per ricostruire immagini ad alta definizione del corpo umano. Per lo studio dettagliato di vasi e tessuti molecolari, viene somministrato per via endovenosa un mezzo di contrasto organo-iodato non ionico.

Norme di sicurezza e precauzioni cliniche per la TC

Trattandosi di un esame con esposizione a Raggi X e somministrazione di contrasto iodato, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- **Pazienti diabetici (Terapia con Metformina):** i pazienti che assumono farmaci antidiabetici a base di Metformina (es. *Metforal*, *Glucophage*, *Metfonorm*) devono sospendere l'assunzione **48 ore prima dell'esame** previo parere del proprio medico curante. L'assunzione potrà riprendere 48 ore dopo la procedura.
- **Radioprotezione e Gravidanza:** è obbligatorio comunicare preventivamente al medico l'eventuale stato di gravidanza certa o presunta per la valutazione del rapporto rischio/beneficio legato all'uso dei Raggi X.
- **Allattamento al seno:** in caso di somministrazione di contrasto iodato, concordare con il medico radiologo le modalità di interruzione temporanea dell'allattamento (solitamente 24 ore).
- **Sensazioni durante l'iniezione:** durante l'immissione del mezzo di contrasto è del tutto normale avvertire una transitoria e diffusa sensazione di calore o un sapore metallico nel cavo orale.

Raccomandazioni post-esame

Dopo l'esecuzione della prestazione, il paziente rimarrà in sala d'attesa per circa 15-20 minuti. Nelle 24 ore successive è raccomandato **bere abbondante acqua (almeno 1,5 litri)** per velocizzare la naturale eliminazione renale del mezzo di contrasto.